



Preparazione per indagini all'iniezione di mezzi di contrasto (TC e RM) per via endovenosa

1) Esami da esibire all'atto dell'esame:

- AZOTEMIA, GLICEMIA, CREATININA, EMOCROMO, QUADRO PROTEICO ELETTOFOREICO, BENCE JONES CON CATENA KAPPA E LAMBDA.
- RX TORACE
- ECG

2) Terapia da eseguire in caso di allergie 3 giorni prima dell'esame:

- ZIRTEC (2 compresse al giorno, somministrate 1 ogni 12 ore);
- ZANTAC 300 (2 compresse al giorno, somministrate 1 ogni 12 ore);
- BENTELAN R (1 compressa al mattino per i 3 giorni).

Il giorno dell'esame il paziente dovrà osservare un digiuno di almeno 8 ore.

In caso di TC ADDOMINALE o RM ADDOMINALE osservare un dieta alimentare. 3 giorni prima dell'esame evitare i seguenti alimenti:

- LEGUMI, LATTE E LATTICINI, VERDURA A FOGLIA VERDE.

Il giorno dell'esame contrastografico esibire esami di preparazione (RX TORACE, ECG, ESAMI DI LABORATORIO), esami radiologici precedenti, eventuali cartelle cliniche.